





31538/A







42550

CAROLI KRAPF  
MAGNI HETRURIAE DUCIS  
ARCHIDUCIS AUSTRIAE,  
ARCHIATRI, ACAD. BOTAN.  
FLORENT. SODALIS  
EXPERIMENTA  
DE  
NONNULLORUM RANUNCULORUM  
VE NENATA QUALITATE, HORUM  
EXTERNO ET INTERNO USU.



---

VIENNÆ AUSTRIÆ,  
EX OFFICINA KRAUSIANA  
M DCC. LXVI.





VIRO  
CLARISSIMO, ac CELEBERRIMO  
HENR. JOANN. NEPOM.  
CRANTZ,

S. C. A. MAJESTAT. CONSILIAR.  
INSTIT. MED. ET MATER. MEDIC.  
VINDOB. PROF. PUBL. ORD. ACAD. IMP.  
NAT. CURIOS. ET SOC. BOTAN.  
FLOR. SODAL.

REI BOTANICÆ PROMOTORI  
SOLERTISSIMO

In leve Gratitudeinis Specimen.

D.

CAROLUS KRAFF.



1880

RECEIVED OF THE

HERRMAN KETON

CLAYTON

C. A. WATKINS

CLAYTON

CLAYTON

CLAYTON

CLAYTON

THE BOTANICAL

CLAYTON

CLAYTON

B

CAROLUS





# PRÆFATIO.

**D**um anno 1763. auctoritate Regia per  
Istriam Austriacam, Corbaviam,  
Murlachiam profisciscerer floræ littoralis Au-  
striacæ conscribendæ causa, sæpe sæpius  
mibi observandi occasio fuit plura insecta  
ex COLEOPTERIS, HEMIPTERIS,  
LEPIDOPTERIS, DIPTERISQUE,  
ranuncolorum delectari floribus. Atque  
præcipue Ranunculum echinatum depa-  
scebatur Meloe proscarabæus (a) & Mor-

A 3

del-

(a) LINNAEI *Systema nature* Nro. 188. p. 419.



della aculeata (b) Buprestis vero viridis (c) cum coccinella nigra (d) & elegantissima Chrysomelæ specie nondum descriptæ (e) devorabant Ranunculi napellifolii germina. Thripem physapum (f) cum Aphide brunnea germina matura ranunculi scelerati destruxisse vidi.

Curiositate rei a me antea nunquam examinatæ inductus degustavi, satis quamvis timide, unum alterumque horum ranunculorum florem, quos venenatos esse audi-  
vi, legi, credidi; & docuit me gustus, flores revera esse acerrimos, unde contentus simplici hoc experimento, quod tenellorum horum insectorum gustus, quiscunque demum ille sit, perferre queat illa,  
quæ

(b) Ibidem Nro. 189.

(c) Ibidem Nro. 184. p. 410.

(d) LINNAEONondum nota.

(e) Hanc in sua Entomologia describet R. P. HOHENWART. e S. J.

(f) LINNAEI Syst. natur. p. 457.



quæ hominis palatum, quamvis durius,  
acriter afficiunt, rem ulteriore examine pro-  
sequi neglexi, mente tunc temporis in col-  
lectione herbarum occupatissima.

Rapuit me tamen brevi post admiratio  
major, neque desiderium fuit minus inqui-  
rendi in venenatam ranunculorum naturam,  
dum armenta in lætis pascentia pratis RA-  
NUNCULUM bulosum, napellifoliumque de-  
vorare cernerem. (g) Interim primo intuitu  
ardua, & periculo plena erant experimen-  
ta, præsertim cum in proprio ea tentanda  
viderem corpore, siquidem ratus, quæ  
fiunt in brutis esse incerta, infida, dolosa.

Quis enim nisi propriæ vitæ vesanus  
contemptor, ranunculi speciem, quæ Sar-  
donia herba DIOSCORIDI dicitur, de-  
glutire auderet, dum asserente DIOSCO-  
RIDE aliisque mentem adimit vescen-  
tibus, & quadam nervorum distensio-

(g) Et si id neget MILLER in off. Botanic.

ne labia in rictum contrahit ita , ut quasi ridendo interimat. (h)

Tamen consideratis stupendis effectibus, quos mercurius sublimatus, causticum sane vehemens, debita methodo datus interne, producit, & incitatus egregius Magnifici Archiatri STÖRCK circa nonnullas venenatas plantas inventis, aggressus audaciter propositum fui, neque labor, difficilis quamvis & periculosus, omni caruit successu. Siquidem & vim venenatam ranunculorum detexi, cicuravi, & in usus internos tute & cum bono effectū adhiberi posse didici.

Experimenta institui varia, & 700 ultra adhibui herbas eo solum fine, ut forte quoddam invenirem antidotum, cum succum *Melissæ* a PETRO Aponensi laudatum (i) & succum *Melissophylli* aceto assumptum

(h) Lib. 6to. Commentar. MATTHIOLI p. 1417.

(i) PETRUS Aponensis de Venenis in 8vo.



ptum, ut antidotum ab AETIO indicatum (k) potius nocivum deprehendissem.

In meis experimentis usus fui Ranunculis: Scelerato, Sardoo, Bulbofo, Echinato, Napellifolio, Illyrico, Pthora, Aquatili, Breynino, & Ficaria, non alia ratione, quam quod illos commodius habere aliis possem.

Nullas nominatim adjeci curas per hos ranunculos factas, partim quod intentio fuerit demonstrare solum modum, quo ranunculi, acerrimum etsi venenum, tute interne adhiberi queant, partim, quod pauca, quæ hucusque habeo, experimenta, non sufficiant ad convincendos illos animos, quibus in punitionem, nescio cujus delicti, provida natura ingenium dedit ipsimet contradicens rerum veritati.

Non tamen acriter, & pertinaciter  
- unguibus, & rostris mea experimenta ita  
defendere volo, ut non forte unum alte-  
rumve sit, quod pro varietate regionis, loci,  
temporis, gustus, ventriculi, aliarumque  
causarum, mihi non notarum, aliter inve-  
niatur, quam ego observavi,  
scripsi.







*Ranunculus Sceleratus.* LINNAEI *Spec.*  
*Plant.* N. 619.

*Ranunculus Sceleratus.* CRANTZ.  
Fasc. II. *Sirp. Austr.*

*Ranunculus palustris apii fol. lævis.*  
C. B. *Apium risus.* TRA GI.

*Ranunculus Sardonius.* GESNER.



**P**lanta magnitudinis variæ  
1½ cubitum sæpe æ-  
quans, *radice* constat  
ex numerosissimis, te-  
nuibus, perpendicularibus, albis,  
longis, composita fibris. *Caulis* est  
te-

tener . extus viridis , interne albus ,  
 cavus spongiosus , & quo planta ma-  
 jor adultior , eo spongiositas notabi-  
 lior , præcipue radicem versus. *Fo-*  
*lia* inferiora longe petiolata , triloba ,  
 caulina in initio adhuc triloba , dein  
 simplicia trifida , suprema integra.  
*Calyx* reflexus ; flos parvus , ex luteo  
 pallens. *Fructus* oblongus , ovatus ,  
 æqualis , glaber , dum maturus , im-  
 patiens tactus. (a)

## EXPERIMENTA.

I. Planta hæc mense Majo , quo  
 floret , collecta radices ita mites ha-  
 bet , ut præter saporem asperum nul-  
 la acrimonia gustu detegatur : tute  
 innoxieque deglutitur , editur impu-  
 ne quocunque modo , sive in aceta-  
 riis , sive decocta in aqua , aut jure  
 carniū . Id expertus fui in ranun-  
 culo scelerato , quem Tergesti in pa-  
 ludosis locis prope meum hortulum  
 collegi , atque præterea in illo , qui  
 Vien-



Viennæ circa Schönbrun in locis aqua stagnante irriguis crescit notabili copia. Observavi tamen nonnunquam in ranunculo hocce, aliis quibusdam in locis collecto, quod gustu leviuscula acredo linguam parumper vellicans, cito tamen evanida, solo relicto aspredinis sensu detegatur; ita inveni in illo, qui prope viam villæ Baumgarten crescit, & præterea in Istria Austriaca.

2. Si radices vellicante sapore pollentes parumper in aqua decoquantur, molles, mitissimæ, orbæ etiam aspredine fiunt; contestas quocunque modo innoxias deprehendi copia quamvis non exigua, aliquoties enim a me & crudæ & coctæ viginti radiculæ deglutitæ fuerunt.

3. Si degustetur caulis, notabilis invenitur quoad saporem differentia in eodem etiam caule; nam quo radiculis propior, eo acredo mitior, quo floribus vicinior, eo acredo urentior; major præterea acredo urens inest junioris plantæ cauli, quam jam adultæ, & fructificationi proximæ;  
to.

totus siquidem caulis radicem versus fungosus, exsuccus, & insipidus tempore fructificationis est, & deglutitus impune a ventriculo fertur. Experimentum a me, & excursionis botanicæ Sociis in Carniolia repetitum aliquoties fuit, absque omni in corpore observabili mutatione.

4. Folia crassa, pingua, succulenta sunt, parumper inter dentes contrita, linguam urente, caustica, intolerabili acredine afficiunt, dolore diu perseverante, maximaque copia salivam alliciunt; si parum longiori tempore post perceptum dolorem in ore retineantur, vel experimentum sæpius reiteretur eadem die (neque necesse est, ut experimentum unum post alterum illico repetatur) lingua inflammatur, excoriatur, ruberrimis elevatis prostantibus papillis, summe dolentibus, quin imo & apex linguæ hinc inde fissus observatur, gustu privatur, & tota linguæ anterior pars styptica quadam, ingrata valde asperitate laborat, ab omnibus fere cibis exasperata. Ingrato-  
fi-



mul dolore afficiuntur dentes, obtusus illos tenet stupor cum vellicatione, & gingivæ pariter ruberrimæ, dolentes, ad attactum fundunt sanguinem. Molesta hæc symptomata octo, decem, perseverant dies, præsertim gustus depravatio & styptica aspreudo in parte anteriori linguæ. Sanationis instantis signum est sensus in lingua perceptus talis, qui ab amylo linguæ applicato oritur.

5. Si flos integer, comprehensus calyce, corolla, staminibus, atque germinibus gustetur, longe major urens dolor percipitur, multoque citius, quam in prioribus ranunculi scelerati partibus jam recensitis. Hæc tamen acredinis vehementia in folis fere germinibus, paucissima vel nulla in reliquis floris partibus observatur. Mala in lingua, dentibus, & gingivis paulo ante *numero quarto* enarrata sæviora fiunt a floribus, pertinaciusque perseverant. Cautè igitur cum illis experimenta instituenda.

6. Folium parumper contusum, & parti laterali cujuscunque digiti alliga-

ligatum , post mediam circiter horam levissimum excitat pruritus , qui increfcit fenfim ; abjecto vero apparatu toto brevi post perceptum pruritus , cutis vix colore mutata apparet , neque dolor fere ullus fenfibilis est ; pedetentim tamen rubefcit cutis , levisque se affociat pruritus , qui etfi non increfcit multum , neque notabilem faciat moleftiam , etiam tenello infanti haud incomodam : tamen post duodecim horas vesica aqua plenissima , fimilis illi , quam applicatum producit vesicatorium , cernitur in loco , ubi rubebat antea cutis .

7. Idem effectus accidit ab applicatis floribus , ea tamen differentia , ut & citius percipiatur pruritus , citiusque oriatur vesica aqua turgens .

8. Sive folia five flores diutius in loco relicta , quam ad primum perceptum pruritus , dolorem excitant fucceffive fortem , urentem , vesicatorio tamen emplastro ex cantharidibus parato minorem , & intra paucas horas adest vesica aqua plena , multo citius visenda a floribus , quam foliis .



9. Vesica hæc aperta ichorem flavescentem, acrem tenuem plorat magna copia, atque diu, neque citius curari potest, quam ubi ichor spissior factus puri magis fit analogus. Pertinax tale saniosum superficiale ulcus quibusvis fere notis resistit remediis consolidantibus; balsamus peruvianus ex omnibus, quæ tentavi, fere solus bonum præstitit effectum, primo tamen locum, dum applicatur, ardore afficit notabili, sed brevi evanido, & tunc mitigat pulchre dolorem fere continuum in aperto ulcere, & citius ad consolidationem perducit, præcipue si quotidie bis applicatus fuerit.

10. Pertinaciter resistit ulcus a ranunculi floribus applicatis tam diu, donec vesica orta fuerit; tribus, quatuor resistere septimanis cum summo meo incommodo, & non exiguo dolore expertus sum.

11. Si vero vesica non aperiatur instrumento, neque attritu rumpatur, sensim circumferentia rubra, & dolens minuitur, & si non valde la-

ta, & magna vesica fit, intra sex, septemve dies collabi, & exsiccari incipit, neque dimidium doloris percipitur toto tempore, quo vesica perstat, & tunc abscedit cuticula callosa jam infra renata alia.

12. Neque multum nocet, si vesica aperiatur, vel casu per attritum rumpatur, si jam semel pruritus remisit, & circumferentia rubra dolens, inflammationis signum evanuit; consolidatio fere æque cito fit, quam si integra mansisset vesica.

Vesiculæ exiguæ valde, etsi aperiuntur, citius tamen majoribus consolidantur, neque refert multum, si ve hoc, si ve illud notum consolidans applicueris remedium; ita in me expertus sum; nam quæcunque hucusque scripsi experimenta, in proprio feci corpore.

13. Si flores vel folia applicentur verrucis digitorum manus prius emolitis, & summitate usque ad vivas partes, & leviusculum stillicidium sanguinis ablata per instrumentum chirurgicum, vel alium acutum cul-  
tel-



tellum, vel forfices, dolor produci-  
tur urentissimus & fere intolerabilis,  
& si diutius relinquantur, periculosa  
inflammatio, fere totum occupans  
digitum, doloris sensu summo per  
totam manum ad humerum usque se  
extendente, cum magna pulsatione,  
& locus undique in vesicam elevatur;  
verruca tamen non aufertur, nisi val-  
de superficialis sit radix ejus, ut sup-  
puratione subsequa possit destrui, at-  
que ulcus ex hoc experimento mole-  
stissimo natum, sanatu difficillimum  
fuit, quatuor septimanis continuo  
ichoris acerrimi copiam notabilem  
fundens.

14. Planta recens, viridis, ab-  
jectis radiculis contusa in mortario  
spiritum spargit inodorum quidem,  
volatilem tamen multum, & ita  
acrem, ut nares, oculosque feriat  
notabiliter, & si in loco angustiori  
hæc contusio plantæ instituatur, ma-  
jori præsertim copia, sternutationem,  
lacrymationemque in adstantibus pro-  
creat. Volatilis hic spiritus citissime  
per totam cameram diffunditur, &

etiam sat eminus stantium nares, oculos, palatumque ferit, vellicat.

15. Idem quoque accidit, licet debilius, si herba recens inter digitos conteratur, & naribus, vel oculis admoveatur, quin imo sola manipulatio herbæ longior, quamvis levissima contrectatione manuum instituta, irritat nares, oculos, fauces, in cubili sat etiam amplo, & aëri pervio.

16. Si succus expressus, qui profunde viridis est, applicetur linguae apici in paucissima tantum quantitate, brevi post urens in lingua oritur dolor similis, imo fortior, quam degustata faciunt folia *Nro. 4to.* & flores *Nro. 5to.* Pertinax hic dolor est, neque facile, affluente maxima licet copia, & diu saliva, ablui & mitigari potest.

17. Si vero succus expressus in aëre aperto relinquatur tam diu, donec exsiccet, mitis fit adeo, ut ad magnam copiam instar alterius innocentis succi herbæ recentis ore volvi, & deglutiri possit.



Ita quoque tota mitescit herba, dum exsiccata est per solum aërem, nullum dat vel minimum acridinis signum; quamvis gustata, masticata, ore diu voluta, deglutita magna copia.

18. Si succus Nro. 16. expressus leni igne inspissetur in formam extracti, exhalat spiritus, narium vellicatione percipiendus, & succus, quo fit spissior eo evadit mitior, inertissimus, ubi in formam extracti reductus fuerit, sapore tunc Spinachiae succum inspissatum referens potius, quam acris ranunculi productum.

Si hoc extractum potui theato, vel & juri carniū misceatur, ad maximam copiam sumi potest, & cum jure carniū admisto butyro, sale, & similibus condimentis, ita gratum sit, ut cibi nutrientis instar comedi queat, & a me aliquoties assumptum fuerit.

19. Si herbae junioris, vel & florum ad maturefcentiam tendentium, manipuli duo in aquae libra una per duas horas decoquantur, herba vel &

flores tunc degustati sunt dulces, omni acredine privi, & oleracei instar cibi cum debitis condimentis edi possunt, quod a pastoribus sylvestrium Murlachiae locorum factum quoque vidi. Decoctum quamvis aqua ad duas tertias partes difflata manet limpidum, flavescentis non ingrati coloris, saporis grate dulcis, demulcentis, amabilius fere liquiritiae decocto, in tussi ab acris stimulo, ab excoriatione, vel catarrho incipiente producta, bonum mihi praestitit persæpe effectum.

20. Si vero decoctum hoc nonnisi una hora ignis vim expertum fuerit, dulce quidem & demulcens primo gustu est, vellicat autem paulo post linguam fortiter, ita tamen, ut perferri acredo possit, neque linguam lædat, relicta solum aspredine linguae cum quadam oris ficcitate.

21. Infusum omnium acerrimum est, urens, inflammans, erodens linguam, & inter infundendum vapor ascendit irritans fortiter oculos & nares, si propius admoveantur, quod



quod & tempore decoctionis observatur.

22. Infusum hoc per 5. 6. imo 8. etiam dies retinet vim acrem, urentem, successive tamen minorem, & tandem evanescentem; permanet autem dulcedo palato grata, sed minor, quam in decocto *Nro. 19.*

23. Folioli recentis medietas, vel & flosculus unus parumper contusus, a me post lautum prius assumptum prandium deglutitus (jejuno enim stomacho id facere vetabat mortis timor) in diversis abdominis partibus produxit dolores ingratissimos, miros, ad nullam notam dolorum speciem facile reducendos, acutos tamen cum levibus deliquiis, & internarum abdominis partium convulsivis velut agitationibus, diu perseverantibus, perceptis quadrante circiter horæ post deglutitionem. Balsamus peruvianus ad 15. guttas assumptus levamen attulit, & penitus dolores tandem delevit haustus aquæ fontanæ dosi libr. 1. repetitis vicibus, intervallo sex circiter minutorum inter quem-

libet haustum interposito. Balsamum peruvianum assumpsi, dum jam per mediam circiter horam durarent molesti dolores.

24. Eosdem numero priori notatos effectus fecerunt duæ guttulæ succi *Nro.* 16. descripti, licet æque post prandium prius assumptum deglutitæ fuissent, hac tamen differentia, quod per totum œsophagi tractum urens, convulsivus dolor se extenderet, & balsamus peruvianus media hora post exortum dolorem assumptus, urentem per totum œsophagum auxit dolorem, brevi tamen evanescentem. Eadem quantitate aquæ hausta, ut paulo ante innui, cessarunt successive incommoda, majora tamen iis, quæ foliolum & flos produxere. Durationem perseverantem dolorum post assumptum balsamum, & aquam accurate non notavi, plenus timore malorum tempus ad horologium mensurare non sollicitus fui, neque tunc id facere mihi venit in mentem, sed confusus & anxius dolebam tantum, me adeo temerarium fuisset.



fuisse, & metuebam, ne totus tractus œsophagi inflammaretur, eroderetur, ut lingua *Nro. 4to.* Forte levis excoariatio facta fuit, nam per sex dies continuo dolebat œsophagus ingratis, & a cibis falsis, vino, aceto, saccharo potui theæ, vel Caffæ admisto, augebatur.

25. Succus recens expressus ad quantitatem unc. semis faucibus infusus cani, cui per tres dies nonnisi exigua quantitas panis data fuit, aqua vero omnis interdicta, assumpto tamen succo illico oblata, & summo desiderio in maxima quantitate hausta, nullos effectus sensibiles fecit, nisi quod canis non ita avide postea assumpserit oblatum assu, ut ego speraveram.

26. Repetito post aliquot dies experimento, & per duas horas denegata aqua post intrusum succum, canis fiebat anxius, vomebat, se agitabat, clamabat, & oblata quamvis aqua & affatim potata nihil melius habuit, revomuit, se contorsit, & inquietissimus noctem transegit; sclo-

peto occisus, diffracto a globulo plumbeo capite, & examinatus calidus adhuc, ventriculum habuit contractum, in variis locis inflammatum, ruberrimum, erosum in interna superficie papillis ruberrimis notabiliter prostantibus; vesiculas aqueas tamen nullas observavi. Pylorus erat tumidus rubro livescens, arctatus capacitatem ita, ut vix pervius appareret.

27. Succus expressus *Nro. 4to.* admisceatur aceto: mixtura fit acerrima, vehementior multo, quam simplex ranunculi succus; idem facit vinum, augendo nempe acrimoniam urentem ranunculi; dein cerevisia, minus tamen ambo, quam acetum. Saccharum & mel fere æque intendunt ranunculi vehementiam, ut acetum. Simile quoque facit sal, spiritus vini quicumque, spiritus nitri, salis communis, vitrioli, & in genere fere omnia, quæ aliquem saporem linguæ imprimunt. Neque oleum, neque lac, neque butyrum multum acrimoniam minuunt, si æquali portione misceantur.



28. Succus expressus *Nro. 4to.* admisceatur æquali quantitati aquæ fontanæ, gustu fit mitior, non tamen ita mitis, ut in ore tolerari absque læsione possit: quo autem pluri quantitate aqua admiscetur, eo magis mitigatur succi acredo, ea quidem ratione, ut drach. semis succi cum unc. sex aquæ mista libere & tute deglutiri possit. Id non solum ego sæpe, & Medicus Fluminensis doctissimus Dominus PATUNA probavimus, sed & aliis hæc aqua cum sanis, tum ægris impune data fuit, & hoc modo ranunculi scelerati acrimonia venenata utilis, & medicata reddi potest augendo plus minus succum admistum aquæ vel potui theato, ut stimulante quidem virtute, innocua tamen, minimos corporis mæandros permeando solvat morbos, quos forte nullum hodie cognitum remedium tollere valet. Melius tamen succo, ægrisque gratius auxilium dat decoctum, quod per durationem majorem minoremve decoctionis (*Nro. 19. 20.*)

magis , minusque penetrans reddi potest.

29. Fortitudo quoque stimuli & acridinis augetur, si decocto , vel infuso , vel succo admisceatur saccharum, increfcens proportionate ad quantitatem præfentis acrimoniæ, ita quidem , ut omnium mitiffimum decoctum evadat ftimulans, tolerabile tamen, & plus minus tolerabile fiat, quo mitius vel acrius decoctum fuit ante admiffionem Sacchari.

Eundem effectum etiam mel facit , acetum, vinum, fpiritus acidi minerales, qui vehementiam acridinis intenfè augment, item Caftoreum, quod tamen ut antidotum laudat  
AETIUS Lib. 13.

30. Si decocto vel infuso inflillentur aliquot guttæ olei tartari per deliquium, color fit faturatius flavus, manet tamen utcunque limpidus; acrimonia vero non mitefcit, fed major exoritur; fi dein huic mifturæ inflillentur duæ, tres, guttæ fpiritus nitri, vel vitrioli , turbatur illico mixtura, color primo brunus oritur, dein



dein nigrescit , & ad fundum deponuntur membranulæ notabili copia coloris primo bruni , dein nigræ factæ ; decoctum tunc acre est æque ut ante , sapor tamen acrimoniæ alius evadit , quam qui in puro infuso aut decocto est. Hæc mutatio coloris , & turbatio decocti etiam accidit , si prius admisto spiritu minerali affundatur oleum tartari per deliquium. Notandum tamen , quod a sola affusione spiritus acidi mineralis non intendatur color flavus , ut ab oleo tartari per deliquium contigit , sed claritas , & pallidus flavus color permanet immutatus.

31. Si infuso vel decocto admisceatur acetum , mixtura non turbatur , neque color mutatur , cui si postea instillantur nonnullæ guttæ olei tartari per deliquium , color parum fuscior fit illico , minusque limpida est infusio , & versus fundum multæ lamellæ gryseæ natare observantur , quæ postea , uti & in priori experimento , in fundo collectæ , adunatæ insipidæ sunt , & terrestres  
cum

cum crassioribus herbæ partibus mistæ esse videntur.

32. Ranunculus recens destillatione sicca dat liquorem acerrimum fortius ipsis floribus degustatis linguam afficientem, qui Tincturam violarum, nec viridem, nec rubeam efficit, mistus tamen aquæ plus minus debilis redditur, prout major vel minor illius quantitas admiscetur: Libræ duæ aquæ ita minuunt drach. semis hujus liquoris acrimoniam, ut innocue interne adhiberi possit. Externe quoque utilis in fistulosis, callosis sinubus ulcerum, ubi detergendum, stimulandum, ut partes mortuæ auferantur, callositas tollatur, fibræ debiles irritentur, affluxus humorum promoveatur, & sic ablata facilius restituantur, redintegrentur.

33. Poteest hic spiritus Nro. 32. si ita dicere licet, diu asservari, si vas bene claudatur, perdit tamen successive suas vires, effoeta fit aqua. Per tres menses conservavi forti acri-



monia pollentem in loco frigido, vitro arena circumdato.

34. Herba ablato hoc spiritu N. 32. acri fit mitissima, dulci, fatuo parumper sapore solum prædita, cæterum innoxia, & ad usus medicos inutilissima.

35. Si ranunculi scelerati folia vel flores mastificentur tamdiu, donec dolor jam fortior in lingua, percipiatur, & postea ejecto ranunculo illico folium acetosæ masticetur per momentum intenditur dolor, postea tamen statim omnis deletur. Experimentum 100es tentatum, 100es succedit, dummodo a frequentiori degustatione nondum sit erosa lingua, tunc potius acetosa dolorem auget, uti omnia alia, quæ saporem quamvis gratissimum habeant.

36. Si ranunculi scelerati folium vel flos cum folio acetosæ simul masticetur, dolor in ore vel minor oritur, & perferendus, vel nullus, si commistio harum duarum herbarum in ore bene fiat.

37. Baccæ ribesiorum immaturæ etiam mitigant dolorem ortum a degustato ranunculo scelerato, vel cum illo masticatæ, penitus tamen, ut Rumex acetosa, non delent.

38. Si acetosa tripla copia ranunculo scelerato mista contundatur in mortario, & succus dein expressus gustetur, mitis est sapore, nulla nota acrimoniæ ranunculi propria imbutus, tute ore volvi, & deglutiri potest ad uncias etiam duas, ut reiteratis in me ipso probavi vicibus. An majori queat copia ingeri absque noxa, ignoro, cum non tentaverim; censeo tamen tale quid impune fieri posse. Hoc & faciunt ribesia immatura, sed majori eorum copia, sextupla fere, opus.

39. Si vero succo ranunculi succus acetosæ commisceatur triplo quamvis majori copia, nulla inde resultat mitigatio urentis acredinis; auctior potius & penetrantior dolor in lingua inde oritur. Magis adhuc intendit acrimoniam succus ribesiorum admistus ranunculi succo, et si  
mul-



multo pluri copia. Neque succus acetosæ illico applicatus linguæ, postquam ranunculus dolorem excitavit degustatus doloris sensum minuit, quod tamen facit folium *Nro. 35.*

40. Neque diminuit ranunculi acrimoniam succus *Melissophylli* purus, neque acetum admistum, ut perhibet *ÆTIUS* (a), neque succus *melissæ* ex aceto, ut refert *PETRUS Aponensis* (b), quæ omnia maxime vim venenatam hujus ranunculi augment; neque denique ulla ex illis plantis omnibus, quas probavi, sequentibus secundum genera & species plantarum *LINNAEI* enumeratis.

## EX MONANDRIIS MONOGYNIIS.

1. *Salicornia europæa.*
2. *Hippuris vulgaris.*
3. *Callitriche verna.*
4. *Blitum capitatum.*
5. *Blitum virgatum.*

(a) *Lib. 13.* (b) *de Venenis.*

## EX DIANDRIIS MONOGYNIIS.

6. *Jasminum* officinale.
7. *Jasminum* humile.
8. *Jasminum* odoratissimum.
9. *Ligustrum* vulgare.
10. *Phillyrea* angustifolia.
11. *Olea* europæa.
12. *Veronica* spicata.
13. *Veronica* hybrida.
14. *Veronica* officinarum.
15. *Veronica* bellidioides.
16. *Veronica* serpillifolia.
17. *Veronica* beccabunga.
18. *Veronica* anagallis.
19. *Veronica* chamædrys.
20. *Veronica* arvensis.
21. *Veronica* verna.
22. *Veronica* hederæfolia.
23. *Gratiola* officinarum.
24. *Verbena* officinarum.
25. *Lycopus* europæus.
26. *Rosmarinus* officin.
27. *Salvia* officinalis.
28. *Salvia* viridis.
29. *Salvia* horminum.
30. *Salvia* sylvestris.



- 31. *Salvia pratensis.*
- 32. *Salvia glutinosa.*
- 33. *Salvia sclarea.*

## EX TRIANDRIIS MONO- GYNIIS.

- 34. *Valeriana officinalis.*
- 35. *Valeriana dioica.*
- 36. *Valeriana tripteris.*
- 37. *Valeriana montana.*
- 38. *Valeriana phu.*
- 39. *Crocus sativus.*
- 40. *Gladiolus communis.*
- 41. *Iris germanica.*
- 42. *Iris aphylla.*
- 43. *Iris biflora.*
- 44. *Iris pumila.*
- 45. *Iris Pseudacorus.*
- 46. *Iris verna.*
- 47. *Iris graminea.*
- 48. *Iris tuberosa.*
- 49. *Schænus aculeatus.*
- 50. *Cyperus arundinaceus.*
- 51. *Cyperus squarrosus.*
- 52. *Cyperus rotundus.*
- 53. *Cyperus elatus.*

- 54. *Cyperus elegans.*
- 55. *Cyperus pumilus.*
- 56. *Scirpus palustris.*
- 57. *Scirpus fluitans.*
- 58. *Scirpus lacustris.*
- 59. *Scirpus holoschoenus.*
- 60. *Scirpus dichotomus.*
- 61. *Scirpus corymbosus.*
- 62. *Scirpus miliaceus.*
- 63. *Scirpus maritimus.*

## EX TRIANDRIIS DIGYNIIS.

- 64. *Panicum alopæcuroides.*
- 65. *Panicum polytachion.*
- 66. *Panicum italicum.*
- 67. *Panicum colonum.*
- 68. *Panicum miliaceum.*
- 69. *Phleum pratense.*
- 70. *Phleum arenarium.*
- 71. *Alopecurus pratensis.*
- 72. *Milium effusum.*
- 73. *Milium confertum.*
- 74. *Agrostis sepium.*
- 75. *Agrostis miliacea.*
- 76. *Agrostis calamagrostis.*
- 77. *Aira minuta.*



78. *Aira cespitosa.*
79. *Poa trivialis.*
80. *Poa pratensis.*
81. *Poa nemorosa.*
82. *Briza minor.*
83. *Briza eragrostis.*
84. *Cynosurus cristatus.*
85. *Festuca ovina.*
86. *Festuca amethystina.*
87. *Festuca bromoides.*
88. *Festuca decumbens.*
89. *Bromus secalinus.*
90. *Bromus purgans.*
91. *Bromus arvensis.*
92. *Stipa avenacea.*
93. *Avena sativa.*
94. *Avena pratensis.*
95. *Avena spicata.*
96. *Hordeum vulgare.*
97. *Hordeum distichon.*
98. *Triticum aestivum.*
99. *Triticum hybernum.*

## EX TETRANDRIIS MONO- GYNIIS.

100. *Globularia vulgaris.*
101. *Dipsacus fullonum.*

- 102. *Scabiosa leucantha.*
- 103. *Scabiosa succisa.*
- 104. *Scabiosa integrifolia.*
- 105. *Scabiosa arvensis.*
- 106. *Scabiosa maritima.*
- 107. *Galium verum.*
- 108. *Galium mollugo.*
- 109. *Galium purpureum.*
- 110. *Galium aparine.*
- 111. *Crucianella angustifolia.*
- 112. *Rubia tinctorum.*
- 113. *Plantago major.*
- 114. *Plantago lagopus.*
- 115. *Plantago media.*
- 116. *Plantago maritima.*
- 117. *Plantago coronopus.*
- 118. *Plantago psyllium.*
- 119. *Sanguisorba officinarum.*
- 120. *Camphorosma Monspeliacum.*
- 121. *Alchemilla vulgaris.*
- 122. *Cuscuta europæa.*

## EX TETRANDRIIS DIGYNIIS.

- 123. *Potamogeton natans.*



# EX PENTANDRIIS MONOGY- NIIS.

- 124. *Myosotis Scorpioides.*
- 125. *Lithospermum officinale.*
- 126. *Lithospermum arvense.*
- 127. *Anchusa officinarum.*
- 128. *Cynoglossum officinarum.*
- 129. *Pulmonaria officinarum.*
- 130. *Symphytum officinarum.*
- 131. *Cerinthe echioides.*
- 132. *Cerinthe maculata.*
- 133. *Borago officinarum.*
- 134. *Lycopsis vesicaria.*
- 135. *Echium vulgare.*
- 136. *Androsace Hall*
- 137. *Primula veris.*
- 138. *Auricula farinosa.*
- 139. *Auricula integrifolia.*
- 140. *Cyclamen europæum.*
- 141. *Menyanthes trifoliata.*
- 142. *Lysimachia vulgaris.*
- 143. *Lysimachia nemorum.*
- 144. *Anagallis arvensis.*
- 145. *Convolvulus arvensis.*
- 146. *Convolvulus sepium.*
- 147. *Convolvulus soldanella.*

- 148. *Campanula uniflora.*
- 149. *Campanula rapunculus.*
- 150. *Campanula persicifolia.*
- 151. *Campanula pyramidalis.*
- 152. *Campanula trachelium.*
- 153. *Campanula perfoliata.*
- 154. *Campanula speculum.*
- 155. *Samolus valerandi.*
- 156. *Lonicera caprifolia.*
- 157. *Lonicera periclymenum.*
- 158. *Verbascum blattaria.*
- 159. *Verbascum lychnitis.*
- 160. *Verbascum phlomoides.*
- 161. *Datura stramonium.*
- 162. *Hyoscyamus niger.*
- 163. *Hyoscyamus pusillus.*
- 164. *Hyoscyamus albus.*
- 165. *Nicotiana tabacum.*
- 166. *Atropa belladonna.*
- 167. *Physalis alkekengi.*
- 168. *Solanum dulcamara.*
- 169. *Solanum nigrum.*
- 170. *Rhamnus catharticus.*
- 171. *Rhamnus alpinus.*
- 172. *Rhamnus frangula.*
- 173. *Rhamnus paliurus.*
- 174. *Rhamnus zizyphus.*

- 175. *Evonimus europæus.*
- 176. *Ribes folia, rubrum.*
- 177. *Ribes grossularia.*
- 178. *Hedera helix.*
- 179. *Vitis vinifera.*
- 180. *Vitis labrusca.*
- 181. *Glaux maritima.*
- 182. *Thesium linophyllum,*
- 183. *Vinca minor.*
- 184. *Nerion oleander.*

## EX PENTANDRIIS DIGYNIIS,

- 185. *Asclepias vincetoxicum.*
- 186. *Chenopodium bonus Henricus.*
- 187. *Chenopodium urbicum.*
- 188. *Chenopodium murale.*
- 189. *Chenopodium vulvaria.*
- 190. *Chenopodium scoparia.*
- 191. *Chenopodium maritimum.*
- 192. *Beta vulgaris.*
- 193. *Salsola kali.*
- 194. *Salsola tragus.*
- 195. *Ulmus campestris.*
- 196. *Sanicula europæa.*
- 197. *Astrantia major.*
- 198. *Astrantia minor.*



199. *Daucus carota.*
200. *Ammi majus.*
201. *Selinum sylvestre.*
202. *Selinum palustre.*
203. *Peucedanum officinarum.*
204. *Peucedanum filaus.*
205. *Crithmum maritimum.*
206. *Ferula nodiflora.*
207. *Laserpitium filer.*
208. *Heracleum sphondylium.*
209. *Heracleum austriacum.*
210. *Ligusticum levisticum.*
211. *Ligusticum austriacum.*
212. *Angelica sylvestris.*
213. *Angelica archangelica.*
214. *Sium fifarum.*
215. *Cuminum cyminum.*
216. *Phellandrium aquaticum.*
217. *Cicuta virosa.*
218. *Æthusa cynapium.*
219. *Coriandrum fativum.*
220. *Scandix pecten.*
221. *Chærophyllyum sylvestre.*
222. *Chærophyllyum aromaticum.*
223. *Seseli pimpinelloides.*
224. *Seseli faxifragum.*
225. *Pastinaca sativa.*

- 226. *Pimpinella saxifraga.*
- 227. *Apium petroselinum.*
- 228. *Aegopodium podagraria.*

## EX PENTANDRIIS TRIGYNIIS.

- 229. *Rhus Cotinus.*
- 230. *Viburnum opulus.*
- 231. *Viburnum acerifol.*
- 232. *Viburnum tinus.*
- 233. *Sambucus ebulus.*
- 234. *Sambucus nigra.*
- 235. *Sambucus racemosa.*
- 236. *Telephium imperati.*
- 237. *Alfina media.*
- 238. *Alfina fegetalis.*

## EX PENTANDRIIS PENTA- GYNIIS.

- 239. *Linum usitatissimum.*
- 240. *Linum tenuifolium.*
- 241. *Linum maritimum.*
- 242. *Linum catharticum.*

## EX HEXANDRIIS MONOGY- NIIS.

- 243. *Galanthus nivalis.*

- 244. *Leucojum* vernum.
- 245. *Narcissus* poëticus.
- 246. *Narcissus* tazetta.
- 247. *Allium* porrum.
- 248. *Allium* lineare.
- 249. *Allium* sativum.
- 250. *Allium* scorodoprasum.
- 251. *Allium* vineale.
- 252. *Allium* oleraceum.
- 253. *Allium* cepa.
- 254. *Allium* moly.
- 255. *Lilium* chalcedonicum.
- 256. *Lilium* martagon.
- 257. *Lilium* bulbiferum.
- 258. *Lilium* candidum.
- 259. *Erythronium* dens canis.
- 260. *Tulipa* sylvestris.
- 261. *Tulipa* Gesneri.
- 262. *Ornithogalum* luteum.
- 263. *Scilla* maritima.
- 264. *Scilla* Lil. hyacinthus.
- 265. *Scilla* italica.
- 266. *Scilla* bifolia.
- 267. *Anthericum* asphodelus.
- 268. *Asparagus* officin.
- 269. *Asparagus* acutifolius.
- 270. *Asphodelus* luteus.



- 271. *Convallaria majalis.*
- 272. *Convallaria verticillata.*
- 273. *Convallaria polygonatum.*
- 274. *Hyacinthus non scriptus.*
- 275. *Hyacinthus cernuus.*
- 276. *Hyacinthus muscari.*
- 277. *Hyacinthus monstrosus.*
- 278. *Aloe variegata.*
- 279. *Juncus acutus.*
- 280. *Juncus squarrosus.*
- 281. *Juncus campestris.*
- 282. *Juncus bufonius.*
- 283. *Berberis vulgaris.*
- 284. *Peplis portula.*

## EX HEXANDRIIS TRIGYNIIS.

- 285. *Rumex maritimus.*
- 286. *Rumex acutus.*
- 287. *Rumex spinosus.*
- 288. *Triglochin maritimum.*
- 289. *Colchicum autumnale.*

## EX POLYGYNIIS.

- 290. *Alisma plantago.*
- 291. *Alisma damasonium.*

## EX HEPTANDRIIS MONO- GYNIIS.

292. *Æsculus hippo-castanum.*

## EX OCTANDRIIS MONOGY- NIIS.

293. *Erica vulgaris.*

294. *Daphne mezereum.*

295. *Daphne thymelæa.*

296. *Daphne laureola.*

297. *Daphne cneorum.*

## EX OCTANDRIIS TRIGYNIIS.

298. *Polygonum bistorta.*

299. *Polygonum persicaria.*

300. *Polygonum aviculare.*

301. *Polygonum fagopyrum.*

302. *Polygonum convolvulus.*

303. *Polygonum scandens.*

## EX OCTANDRIIS TETRA- GYNIIS.

304. *Paris.*

305. *Adoxa moschatellina.*

EX ENNEANDRIIS MONO-  
GYNIIS.

306. *Laurus*.

EX DECANDRIIS MONOGY-  
NIIS.

307. *Dictamnus* albus.

308. *Ruta* graveolens.

309. *Pyrola* rotundifolia.

EX DECANDRIIS DIGYNIIS.

310. *Saxifraga* cotyledon.

311. *Saponaria* officin.

312. *Dianthus* barbatus.

313. *Dianthus* armeria.

314. *Dianthus* caryophyllus.

315. *Dianthus* plumarius.

EX DECANDRIIS TRIGY-  
NIIS.

316. *Drypis* spinosa.

317. *Stellaria* nemorum.

318. *Arenaria* saxatilis.

319. *Arenaria* tetraquet.



EX DECANDRIIS PENTAGY-  
NIIS.

- 320. *Sedum telephium*.
- 321. *Sedum acre*.
- 322. *Sedum verticillatum*.
- 323. *Sedum anaëampferos*.
- 324. *Lychnis flos cuculi*.
- 325. *Lychnis viscaria*.
- 326. *Cerastium vulgatum*.
- 327. *Cerastium viscosum*.
- 328. *Spergula arvensis*.

EX DODECANDRIIS MONO-  
GYNIIS.

- 329. *Asarum europæum*.
- 330. *Portulaca oleracea*.

## EX DODECANDRIIS DIGYNIIS.

- 331. *Agrimonia eupatoria*.
- 332. *Agrimonia agrimonoides*.

EX DODECANDRIIS TRIGY-  
NIIS.

- 333. *Reseda luteola*.
- 334. *Reseda alba*.

- 335. *Euphorbia tithymalus.*
- 336. *Euphorbia peplis.*
- 337. *Euphorbia verrucosa.*
- 338. *Euphorbia esula.*
- 339. *Euphorbia cyparissus.*

## EX DODECANDRIIS DODE- CAGYNIIS.

- 340. *Sempervivum tectorum.*

## EX ICOSANDRIIS MONOGY- NIIS.

- 341. *Philadelphus coronar. fol. flor.*
- 342. *Myrtus communis. fol. flor.*
- 343. *Punica granatorum. flor. fol. fruct.*
- 344. *Amygdalus persica. fol. flor.*
- 345. *Amygdalus communis. fol. flor.*
- 346. *Prunus padus. fol.*
- 347. *Prunus machaleb. fol. flor.*
- 348. *Prunus armenia. fol. flor.*
- 349. *Prunus cerasus. fol. flor. fruct.*
- 350. *Prunus domestica. fol. flor.*
- 351. *Prunus insititia. fol. flor.*
- 352. *Prunus spinosa. fol. flor.*

## EX ICOSANDRIIS DIGYNIIS.

- 353. *Cratægus* aria.
- 354. *Cratægus* torminalis.
- 355. *Cratægus* oxyacantha.
- 356. *Cratægus* azarolus.

## EX ICOSANDRIIS TRIGYNIIS.

- 357. *Sorbus* aucuparia.
- 358. *Sorbus* domestica.

## EX ICOSANDRIIS PENTAGYNIIS.

- 359. *Mespilus* germanicus.
- 360. *Mespilus* amelanchier.
- 361. *Mespilus* chamæmespilus.
- 362. *Pyrus* communis.
- 363. *Pyrus* malus.
- 364. *Pyrus* cydonia. fol. flor.

## EX ICOSANDRIIS POLYGYNIIS.

- 365. *Rosa* canina.
- 366. *Rosa* alba.
- 367. *Rosa* gallica.
- 368. *Rubus* idæus.



- 369. *Rubus chamæmorus.*
- 370. *Rubus fruticosus.*
- 371. *Fragaria vesca.*
- 372. *Potentilla anserina.*
- 373. *Potentilla pimpinelloides.*
- 374. *Potentilla argentea.*
- 375. *Potentilla verna.*
- 376. *Tormentilla erecta.*
- 377. *Tormentilla reptans.*
- 378. *Geum urbanum.*

## EX POLYANDRIIS MONOGY- NIIS.

- 379. *Actæa racemosa.*
- 380. *Chelidonium corniculatum.*
- 381. *Chelidonium majus.*
- 382. *Papaver rhœas.*
- 383. *Tilia europæa.*
- 384. *Cistus fumana.*
- 385. *Cistus salviifolia.*
- 386. *Cistus helianthemum.*

## EX POLYANDRIIS DIGY- NIIS.

- 387. *Pæonia officinalis.*

EX POLYANDRIIS TRIGY-  
NIIS.

- 388. *Delphinium* consolida.
- 389. *Delphinium* elatum.
- 390. *Aconitum* lycoctonum.
- 391. *Aconitum* napellus.

EX POLYANDRIIS PENTA-  
GYNIIIS.

- 392. *Aquilegia* vulgaris.
- 393. *Nigella* fativa.
- 394. *Nigella* arvensis.

EX POLYANDRIIS POLYGY-  
NIIS.

- 395. *Anemone* hepatica.
- 396. *Anemone* vernalis.
- 397. *Anemone* pulsatilla.
- 398. *Anemone* pratensis.
- 399. *Aragene* alpina.
- 400. *Clematis* viticella.
- 401. *Clematis* vitalba.
- 402. *Clematis* flammula.
- 403. *Adonis* vernalis.
- 404. *Trollius* europæus.

- 405. *Helleborus niger*.
- 406. *Helleborus viridis*.
- 407. *Caltha palustris*.

## EX DIDYNAMIIS GYMNO- SPERMIIS.

- 408. *Teucrium botrys*.
- 409. *Teucrium chamæpithys*.
- 410. *Teucrium scorodonia*.
- 411. *Teucrium chamædris*.
- 412. *Teucrium flavum*.
- 413. *Teucrium polium*.
- 414. *Satureja hortensis*.
- 415. *Hyssopus officinalis*.
- 416. *Nepeta cataria*.
- 417. *Nepeta hirsuta*.
- 418. *Nepeta italica*.
- 419. *Lavandula spica*.
- 420. *Lavandula stœchas*.
- 421. *Betonica officinalis*.
- 422. *Sideritis montana*.
- 423. *Sideritis scordioides*.
- 424. *Mentha crispa*.
- 425. *Mentha spicata*.
- 426. *Mentha aquatica*.
- 427. *Mentha pulegium*.
- 428. *Mentha arvensis*.
- 429. *Lamium album*.



- 430. *Lamium amplexicaule.*
- 431. *Glecoma hederaceum.*
- 432. *Galeopsis tetrahit.*
- 433. *Stachys sylvatica.*
- 434. *Stachys palustris.*
- 435. *Stachys glutinosa.*
- 436. *Ballota nigra.*
- 437. *Ballota alba.*
- 438. *Marrubium vulgare.*
- 439. *Marrubium pseudodictamnus.*
- 440. *Clinopodium vulgare.*
- 441. *Origanum vulgare.*
- 442. *Origanum majorana.*
- 443. *Thymus serpyllum.*
- 444. *Thymus vulgaris.*
- 445. *Thymus zygis.*
- 446. *Thymus pulegioides.*
- 447. *Thymus alpinus.*
- 448. *Melissa officinalis.*
- 449. *Melissa grandiflora.*
- 450. *Melissa calamintha.*
- 451. *Melissa nepeta.*
- 452. *Dracocephalus moldavicus.*
- 453. *Melittis melissophyllum.*
- 454. *Ocimum basilicum.*
- 455. *Prunella vulgaris.*
- 456. *Prunella laciniata.*

# EX DIDYNAMIIS ANGIO- SPERMIIS.

- 457. *Rhinanthus* elephas.
- 458. *Rhinanthus* trixago.
- 459. *Rhinanthus* cristagalli.
- 460. *Euphrasia* officinalis.
- 461. *Euphrasia* lutea.
- 462. *Melampyrum* arvense.
- 463. *Melampyrum* nemorosum.
- 464. *Melampyrum* pratense.
- 465. *Lathræa* squammaria.
- 466. *Pedicularis* comosa.
- 467. *Antirrbinum* cymbalaria.
- 468. *Antirrbinum* arvense.
- 469. *Antirrbinum* linaria.
- 470. *Scrophularia* aquatica.
- 471. *Scrophularia* canina.
- 472. *Digitalis* lutea.
- 473. *Orobanche* lævis.
- 474. *Orobanche* cernua.
- 475. *Vitex* agnus castus.

# EX TETRADYNAMIIS SILICU- LOSIS, SILIQUOSIS.

- 476. *Myagrum* perfoliatum.
- 477. *Myagrum* lativum.

- 478. *Draba verna*.
- 479. *Lepidium perfoliatum*.
- 480. *Lepidium rudera*le.
- 481. *Thlaspi arvense*.
- 482. *Thlaspi perfoliatum*.
- 483. *Thaspi bursa pastoris*.
- 484. *Cochlearia officinalis*.
- 485. *Cochlearia coronopus*.
- 486. *Cochlearia armoracea*.
- 487. *Alyssum campestre*.
- 488. *Alyssum alyssoides*.
- 489. *Dentaria pentaphyllos*.
- 490. *Cardamine impatiens*.
- 491. *Cardamine pratensis*.
- 492. *Sisymbrium nasturtium*.
- 493. *Sisymbrium sophia*.
- 494. *Erysimum officinale*.
- 495. *Erysimum alliaria*.
- 496. *Cheiranthus erysimoides*.
- 497. *Arabis turritis*.
- 498. *Turritis glabra*.
- 499. *Turritis hirsuta*.
- 500. *Brassica napus*.
- 501. *Brassica rapa*.
- 502. *Brassica oleracea*.
- 503. *Brassica eruca*.
- 504. *Synapis arvensis*.



505. *Raphanus sativus*.

506. *Bunias kakile*.

507. *Isatis tinctoria*.

EX MONADELPHIIS DECAN-  
DRIIS.

508. *Geranium cicutarium*.

509. *Geranium robertianum*.

510. *Geranium pratense*.

511. *Geranium gruinum*.

EX MONADELPHIIS POLYAN-  
DRIIS.

512. *Althæa officinalis*.

513. *Malva sylvestris*.

514. *Malva tomentosa*.

515. *Malva alcea*.

EX DIADELPHIIS HEXAN-  
DRIIS.

516. *Fumaria bulbosa*.

517. *Fumaria officinalis*.

518. *Fumaria capnoides*.

## EX DIADELPHIIS OCTAN- DRIIS.

519. *Polygala vulgaris*.  
520. *Polygala chamæbuxus*.

## EX DIADELPHIIS DECAN- DRIIS.

521. *Genista tinctoria*.  
522. *Ononis arvensis*.  
523. *Ononis spinosa*.  
524. *Ononis pusilla*.  
525. *Anthyllis vulneraria*.  
526. *Collutea arborescens*.  
527. *Pisum sativum*.  
528. *Pisum ochrus*.  
529. *Orobus vernus*.  
530. *Orobus niger*.  
531. *Lathyrus aphaca*.  
532. *Vicia cracca*.  
533. *Vicia dumetorum*.  
534. *Vicia sativa*.  
535. *Vicia faba*.  
536. *Coronilla securidaca*.  
537. *Coronilla coronata*.  
538. *Ornithopus scorpioides*.  
539.

- 539. *Hedysarum onobrychis.*
- 540. *Galega officinalis.*
- 541. *Galega fruticosa.*
- 542. *Astragalus vesicarius.*
- 543. *Astragalus campestris.*
- 544. *Astragalus glaux.*
- 545. *Trifolium officinale.*
- 546. *Trifolium pratense.*
- 547. *Trifolium repens.*
- 548. *Lotus tetragonolobus.*
- 549. *Lotus prostratus.*
- 550. *Medicago falcata.*
- 551. *Medicago polymorpha.*

## EX POLYADELPHIIS ICOSAN- DRIIS.

- 552. *Citrus aurantia.*
- 553. *Citrus medica.*

## EX POLYADELPHIIS POLYAN- DRIIS.

- 554. *Hypericum perforatum.*
- 555. *Hypericum androsæmum.*
- 556. *Hypericum coris.*



# EX SYNGENESIIS POLYGAMIIS ÆQUALIBUS.

- 557. *Tragopogon pratense*.
- 558. *Scorzonera graminifolia*.
- 559. *Scorzonera purpurea*.
- 560. *Scorzonera humilis*.
- 561. *Sonchus pratensis*.
- 562. *Lactuca sativa*.
- 563. *Lactuca virosa*.
- 564. *Chondrilla juncea*.
- 565. *Prenanthes tenuifolia*.
- 566. *Prenanthes purpurea*.
- 567. *Leontodon taraxacum*.
- 568. *Hieracium pilosella*.
- 569. *Hieracium aurantiacum*.
- 570. *Hieracium fabaudum*.
- 571. *Hieracium amplexicaule*.
- 572. *Hieracium auricula*.
- 573. *Hyoseris foetida*.
- 574. *Hypochaeris maculata*.
- 575. *Lampsana rhagadiolus*.
- 576. *Lampsana stellata*.
- 577. *Cichorium intybus*.
- 578. *Cichorium endivia*.
- 579. *Scolymus maculatus*.
- 580. *Arctium lappa*.

- 581. *Arctium* personata.
- 582. *Carduus* leucographus.
- 583. *Carduus* nutans.
- 584. *Carduus* acanthoides.
- 585. *Carduus* mollis.
- 586. *Carduus* eriophorus.
- 587. *Carduus* ferratuloides.
- 588. *Cnicus* acarna.
- 589. *Cynara* scolymus.
- 590. *Cynara* cardunculus.
- 591. *Carlina* acaulis.
- 592. *Carthamus* tinctorius.
- 593. *Eupatorium* cannabinum.

## EX SYNGENESIIS POLYGAMIIS SUPERFLUIS.

- 594. *Tanacetum* vulgare.
- 595. *Tanacetum* balsamita.
- 596. *Artemisia* abrotanum.
- 597. *Artemisia* santonicum.
- 598. *Artemisia* ponticum.
- 599. *Artemisia* absinthium.
- 600. *Artemisia* vulgaris.
- 601. *Gnaphalium* stœchas.
- 602. *Gnaphalium* arenarium.
- 603. *Gnaphalium* laxatile.

- 604. *Tussilago farfara*.
- 605. *Tussilago petasites*.
- 606. *Senecio vulgaris*.
- 607. *Aster tripolium*.
- 608. *Aster vernus*.
- 609. *Inula helenium*.
- 610. *Inula crithmifol*.
- 611. *Arnica montana*.
- 612. *Doronicum pardalianches*.
- 613. *Doronicum bellidiastrum*.
- 614. *Bellis annua*.
- 615. *Chrysanthemum leucanthemum*.
- 616. *Matricaria parthenium*.
- 617. *Matricaria chamomilla*.
- 618. *Anthemis millefolia*.
- 619. *Achillea millefolium*.

## EX POLYGAMIIS FRUSTRA- NEIS.

- 620. *Centaurea crupina*.
- 621. *Centaurea centaurium*.
- 622. *Centaurea cyanus*.
- 623. *Centaurea collina*.
- 624. *Centaurea calcitrapa*.
- 625. *Centaurea solstitialis*.
- 626. *Centaurea montana*.



# EX POLYGAMIIS NECESSARIIS.

- 627. *Calendula officinalis*.
- 628. *Filago arvensis*.
- 629. *Filago montana*.
- 630. *Filago maritima*.

# EX SYNGENESIIS MONOGAMIIS.

- 631. *Viola odorata*.
- 632. *Viola canina*.
- 633. *Viola tricolor*.
- 634. *Impatiens balsamina*.
- 635. *Impatiens noli me tangere*.

# EX GYNANDRIIS DIANDRIIS.

- 636. *Orchis bifolia*.
- 637. *Orchis morio*.
- 638. *Satyrium hircinum*.
- 639. *Ophrys nidus avis*.
- 640. *Serapias helleborine*.

# EX GYNANDRIIS HEXANDRIIS.

- 641. *Aristolochia rotunda*.
- 642. *Aristolochia longa*.

EX

## EX GYNANDRIIS POLYANDRIIS.

643. *Arum esculentum*.644. *Arum sagittæfolium*.

## EX MONOECIIS TRIANDRIIS.

645. *Typha latifolia*.646. *Typha angustifolia*.647. *Sparganium erectum*.648. *Coix lacryma*.649. *Coix squarrosa*.

## EX MONOECIIS TETRAGYNIIS.

650. *Betula alba*.651. *Betula nigra*.652. *Buxus sempervivus*.653. *Urtica urens*.654. *Morus nigra*.655. *Morus alba*.656. *Xanthium spinosum*.657. *Amaranthus tricolor*.

## EX MONOECIIS POLYANDRIIS.

658. *Quercus ilex*,

659.

- 659. *Quercus robur.*
- 660. *Quercus nigra.*
- 661. *Juglans.*
- 662. *Fagus castanea.*
- 663. *Carpinus betula.*
- 664. *Corylus avellana.*
- 665. *Platanus occidentalis.*

### EX MONADELPHIIS.

- 666. *Pinus sylvestris.*
- 667. *Pinus pinea.*
- 668. *Pinus tæda.*
- 669. *Pinus abies.*
- 670. *Cupressus sempervirens.*
- 671. *Ricinus communis.*

### EX MONOECIIS SYNGENESIIS.

- 672. *Momordica balsamina.*
- 673. *Cucurbita lagenaria.*
- 674. *Cucurbita pepo.*
- 675. *Cucurbita citrullus.*
- 676. *Cucumis anguria.*
- 677. *Cucumis melo.*
- 678. *Cucumis sativus.*
- 679. *Bryonia alba.*



## EX DIOECIIS PENTANDRIIS.

680. *Spinacia oleracea*.681. *Humulus lupulus*.

## EX HEXANDRIIS.

682. *Smilax aspera*.

## EX OCTANDRIIS.

683. *Populus alba*.684. *Populus nigra*.

## EX ENNEANDRIIS.

685. *Mercurialis annua*.

## EX DIOECIIS SYNGENESIIS.

686. *Ruscus aculeatus*.

## EX POLYGAMIIS MONOECIIS.

787. *Veratrum album*.688. *Cenchrus echinatus*.689. *Ægilops squarrosa*.690. *Parietaria officinalis*.691. *Atriplex hortensis*.692. *Atriplex littoralis*.693. *Acer campestris*.

## EX POLYOECIIS.

694. *Ficus Carica*.

41. Omnes jam modo recensitæ  
 herbæ vel non minuerunt acrimoniam  
 ranunculi scelerati, vel plus minus  
 auxerunt, non tamen accurate adno-  
 tavi omnes, quæ cæteris paribus do-  
 lorem plus auxerunt, exceptis *Chæ-*  
*rophylo*, *Taraxaco*, *Valeriana* minore,  
 foliis *sambuci*, *ægopodio*, *hedera* tere-  
 stri, foliis *ribesiorum*, & *fragariæ*,  
 succoque *Melissophylli*,  
 & *Melissæ*.



Ranunculus *Bulbosus*. CRANTZ p. 89.  
Nro. 8. Fasc. II do. Stirp. Austr.

Ranunculus pratenfis radice verticilli  
modo rotunda. C. B. *pin.*

Ranunculus bulbosus. L O B. *icon.*

Ranunculus tuberosus. D O D. *pempt.*  
*icon.* p. 428.

Crescit hic ranunculus ubique in pratis: magna ludit varietate quoad habitum externum; magnitudo enim diversa caulis per sæpe cer- nitur, qui jam altus, ramosus, pi- losus multiflorus, jam parvus, & sim- plex, uniflorus, nonnullis foliis mo- do profundius incisus, lobatis, modo pinnatifidis, colore vel viridiori, vel & pallido. Et hæc differentia pen- det a ratione loci, ubi crescit: in lo- cis siquidem siccis apricis minor fere semper planta est, pallidioribus foliis magisque hirsutis, dum ex adverso in pascuis fertilioribus, cultisque lo- cis, ad pedis & ultra magnitudinem crescit, ut primo intuitu specie di-  
ver-



versæ credantur herbæ , sola quamvis accidentali varietate distinctæ.

## EXPERIMENTA.

1. Species hæc priori ranunculo minus succulenta est, & dum tenera, in omnibus suis partibus valde acris est, neque acrimoniæ urentis intensitas pro ratione partis differt, siue enim radix, siue caulis, siue folia, siue flores degustentur, æqualis fere imprimitur urens linguæ dolor, non ita tamen cito, ut in ranunculo scelerato se manifestans, diutius tamen perseverans, & ut me repetita docuit experientia, acrius linguam vulnerans, si incautius gustetur, & majora, periculosiora pertinacioraque mala linguæ, dentibus, gingivis inferens.

2. Dum vero in fructificatione constituta hæc herba est, diversitas notabilis est quoad acrimoniam in caule, & foliis; folia enim radicalia, & omnia alia, quo pallidiora, & magis exsucca evaserunt, eo minus acria,

imo mitissima inveni; similiter etiam caulis mitescit, qui quo magis lignosus est, eo fit inertior; ut igitur fructificationis tempore vehementia acredinis nocivæ fere solum sit in radice & floribus, vel potius germinibus, cum calyx & petala floris, atque stamina vix acria deprehendantur.

Præterea docet gustus bulbi radículas esse acres ante fructificationem, hujus vero tempore, quod mirum, fieri inertes, bulbum tamen fere evadere acriorem, imo acriorem germinibus.

3. Folia vel germina parumper contusa, parti laterali cujusdam digiti applicata citius pruritum excitant, citiusque vesica aqua turgida oritur, quam a foliis, vel floribus ranunculi scelerati *Nro. 6.* pertinaciusque ulcus sanationi resistit.

4. Taleolus radicis bulbosæ recentis applicatus parti interiori cujusdam digiti, post duo minuta prima jam incipit leniter urere, & quo diutius retinetur applicatus, eo dolor urens

urens fit major ; abjecto vero illico post perceptum pruritus, cutis vix erat rubra, & pruritus etiam illico cessavit, post duas tamen circiter horas rubescebat, leviter pruriebat, & intra 10. horas erat vesica notabilis, plena aqua, proportionata latitudini taleoli applicati ; aperta vesica plorabat copiosum humorem, tenuem, flavescentem, & urentem; consolidatio tardior fuit, quam in vesiculis excitatis a priori ranunculo *Nro. 9.* notatis, majorique dolore stipatum erat ulcus, & tardius ichor in puriformem mutabatur naturam, seu consistentiam.

5. Radiculæ bulbi parumper contusi, & digitorum interstitiis applicati, per quadrantem horæ vix pruritus excitant, ubi tamen semel percipitur, abjectis tunc illico cutis non est mutata, post viginti horas tamen vesicula aqua plena præsens est; hoc autem tantum præstant radiculæ ante florescentiæ tempus, postea enim, etsi per diem in loco relictæ, nullum effectum faciunt.



6. Si vero taleolus *Nro. 4to.* diutius applicatus relinquatur, quam ad sensum primum pruritus, dolor fit successive magnus, & vesica multo citius adest, majorque circa vesicam est inflammatio, & pertinacior notabiliter ad locum ulceratum affluxus ichoris, isque dolorificus. Balsamus peruvianus tunc optimum a me probatum remedium.

7. Non tamen ab applicato taleolo per duas horas, aut ultra increvit semper dolor, observavi solum per horam increvisse, & postea cessasse relicto solum illo pruritu dolorifico, qui fuit, dum vesica formari incipit; in priori *Nro. 4to.* experimento videtur taleolus vim urentem per exsiccationem perdere; ablatum enim tunc gustu fere effœtus est, & exsuccus. Taleolum similem applicatum tenui super verrucam, ad stillicidium sanguinis usque læsam, per sex horas, donec vesica exorta fuisset, neque majorem dolorem sensi, quam qui adfuit post 10. prima minuta, qui quidem molestus multum erat

erat ob nudas, quas immediate tangebat partes. Neque intelligo, cur ranunculus sceleratus Nro. 13. pejora produxerit mala; forte quod taleolus sua planitie se minus insinuare potuerit partibus vivis, quam folia vel flores contusi ranunculi bulbosi? forte quod in priori verruca denudatus fuerit quidam nervulus, qui in hac vel absens, vel tectus esse poterat? quidquid vero sit ob molestum pertinax ulcus a tali experimento ortum, effectum sæpius periclitari nolui.

8. Bulbi viginti circiter in parvos taleolos discissi, & per horam in aquæ libra una decocti fiunt molles, inter digitos contriti facile dehiscunt, cum quadam glutinositate radicis althææ instar, & saporis sunt demulcentis, non ingrati, levissime glutinosi, tute per se, vel aceto, sale & oleo conditi comedi possunt.

Residua aqua, in qua bulbi per horam decocti fuerunt, limpida est æque, ut ante decoctionem fuit, sa-

poris nullius, vel fatui tantum, qualis in aqua cocta plerumque adest.

9. Inter decoctionem exhalat vapor acris, validius oculos feriens, quam si folia vel flores decoquantur.

10. Bulbi hi diu asservari possunt etiam in aere calido, absque amissione suæ totius acrimoniæ: per quatuor septimanas in vestibus meis mense Junio, & Julio tenui, & tamen taleolus abscissus, & applicatus cuti, vesicam excitavit eo fere modo, ut *Nro. 4.* notavi, postea tamen exsiccati fiunt effœti, & mitissimi.

11. Si vero bulbi in loco frigidiusculo sub fabulo servantur, etiam hyemalibus mensibus idem, quod recentes præstant.

12. Similiter quoque germina recentia acria valde ad manipulos duos in libra una aquæ per horam decocta omnem fere amiserunt acrimoniam; vix enim levissimo in lingua vellicante perceptibili stimulo aqua facta subviridescens, clara tamen, & saporem adepta dulcem, fuit, quasi liquiritiæ decoctum degustares, hac tamen  
dif-



differentia , quod tribus circiter minutis primis post deglutitionem duorum cochlearium per os levis vellitatio perciperetur cum quadam aspreddine , & post quadrantem horæ similis in ventriculo sentiretur vellitatio durans per horam , quod non fecit decoctum bulborum ; non tamen propterea appetitus mutatus fuit , neque aliud incommodum fenfibile fe manifeftavit.

13. Radix, germina , quo minori tempore decoquuntur , eo decoctum fortius, urentius ; infufum igitur omnium acerrimum ; gultus hinc optime detegit , quo gradu acris decocti ftimulus interne tute adhiberi poffit ; quamprimum enim lingua perfert facile acredinem , neque pofttea magna remanet ftiptica afpreddo , fignum eft decoctum impune perferri a ventriculo poffe.

14. Hujus ranunculi infufum, decoctum, quantumcunque acre fit, admiftione aquæ temperari, mitigari inersque reddi poteft ; uti de fucco ranunculi fcclerati Nro. 28. obfervata docent.

15. Si fuccus expressus ex contusa tenera herba, vel & jam florecente gustetur, mitissimus in principio apparet, post 4. 5, 6, circiter minuta secunda vehementia acrimoniæ se prodit, eo tunc penetrantius linguam offendens, & longe potentius, quam ranunculi scelerati *Nro.* 16. fuccus. Validum simul ac periculolum sternutatorium est, nares excorians, inflammans, nisi illico emungatur; unde experimenta repetentes sibi ab incautiori examine caveant, ne vel deglutiant, vel ore diutius retineant, agitentque inter dentes.

16. Succus hic mistus cum succo *Melissæ*, vel *Melissophylli*, triplo quamvis majori copia, acrimoniam non amittit, acutior potius evadit; neque acetum, neque vinum acrem vim minuunt, neque saccharum, mel, spiritus vini, neque spiritus acidi minerales, aut oleum tartari per deliquium, neque castoreum, neque opium, sed omnia hæc exacerbabant rodentem succi indolem. Plures herbas non subjeci examini, cum ea  
huic

huic ranunculo qualitas acrimoniæ in-  
sit , quæ ranunculo scelerato , unde  
experimenta cum ante *Nro. 40.* re-  
censitis plantis reiterare superfluum  
duxi, præsertim cum ingens labor,  
dolor adhuc patientiam requi-  
rat laxeam.

17. Experimenta cum acetosa,  
ribesiis instituta fuere eadem, quæ  
*Nro. 35. 36. 37. 38. 39.* cum ranun-  
culo scelerato exposui; similiter &  
succus hujus ranunculi aquæ mistus  
plus minus iners redditur & interne-  
tute assumitur, uti ranunculi prioris  
succus *Nro. 28* notati.

18. Si succi *Nro. 16.* drach. semis  
misceatur unc. viij. ix. aquæ fontanæ,  
ita mitescit, ut absque omni noxa bi-  
bi possit; excitat quidem quemdam  
languorem levissimum in ventriculo  
post quadrantem circiter horæ, quan-  
doque tardius, postea tamen quædam  
per omnes actiones musculares major  
sensibilis levitas & agilitas sentitur,  
urina prodit majori copia, præcipue  
si bis, ter, per diem assumatur.

19. Si huic misturæ *Nro. 18.* ad-  
da-



datur saccharum, illico fit acris, & assumptu difficilior. Idem etiam facit mel, & acetum, vinum, & omnia, quæ *Nro. 17.* notavi. Castoreum tamen & opium ex omnibus adhuc tutissima, quibus admistis, levis quidem acrimonia accedit, non tamen talis, quæ incommodam ob acredinem redderet mixturam.

20. Germina etsi sint valde acria ut antea *Nro. 2.* innui, tamen femina, dum matura sunt, prorsus evadunt insipida, & degustata, masticata, deglutita, nullam molestiam procreant, præter levem stipticam in lingua aspredinem. Tota ergo planta, dum exsiccata est, sua fit iners acrimonia venenosa, & radix bulbosa, si bene exsiccata est, in pulverem contusa, naribus attracta, nullam excitat sternutationem; saltem id me meæ docuerunt nares, licet non adeo collosas judicem, ut tabacco assuetas nares. Si vero non penitus exsiccata prius fuit, irritat nares, & quandoque lenem sternutationem promovet.

*Ranunculus Echinatus*. CRANTZ Fasc. II.  
*Stirp. Austr.* p. 95. N. 13.

*Ranunculus arvensis*. LINN. *Syst. Nat.*  
p. 1087.

*Ranunculus arvensis echinatus*. C. B.  
p. 179.

**F**acile ab aliis distinguitur, floribus  
minimis, unguibus limbo majori-  
bus, seminibus complanatis aculeis  
instructis.

## EXPERIMENTA.

1. Radix gustata linguæ fatuum  
stipticum solum saporem imprimit,  
nulla fere vellicatio percipitur; dum  
vero deglutitur, vel profundius in  
ore volvitur prius bene masticata, tunc  
in velo pendulo, & palati fornicati  
parte quædam, exigua tamen & to-  
lerabilis acredo vellicans sentitur,  
sponte & brevi evanescens. Deglu-  
titæ radiculæ nil mali faciunt, nul-  
lam vesicam producant applicatæ,  
etsi

etfi per horam integram applicentur.

2. Folia masticata majorem vellitantem stimulum linguæ imprimunt, palato, & velo pendulo, tolerabilem quidem, & minorem, quam ranunculi ficariæ granulatae radices, cujus tamen folia & flores verno tempore in acetariis comeduntur magna copia, & antiscorbuticis admiscuntur.

3. Applicatum folium cuti in interstitiis digitorum, vel & in alia parte vesicam excitat, ut ranunculus sceleratus, & bulbosus, tardius tamen & non nisi post 24. horas, & dum vesica fieri incipit, similis oritur pruritus ut a prioribus ranunculis.

4. Flos degustatus ex omnibus hujus ranunculi partibus acerrimus, & hæc acrimonia in germinibus tota est. Urit ita acriter linguam, ut ranunculi scelerati flores, remanente postea stiptica aspredine ingrata, cum stupore dentium; stimulus tamen hic acris citius elutione salivæ evanescit,



scit, seu deletur, quam ingratus dolor productus a ranunculis scelerato & bulbofo.

5. Flos non contusus applicatus digito levem fecit pruritus post mediam horam; illico abstuli apparatus, saliva ablui locum, postea aqua, ne quid hærens adhuc inter exiguas cutis rugas maneret; nulla videbatur rubedo, neque ullus aderat pruritus post ablationem floris ex loco, hora tamen post ablutionem parumper ad attactum pruriebat locus, fiebat ruber, & post 10. horas numerando ab applicationis momento aderat vesica aqua turgidissima, licet pruritus ad exortum vesicæ usque perdurans esset levis, facillime tolerabilis, major tamen quam a foliis.

6. Si vero flos contusus applicetur citius longe percipitur pruritus, & citius adest vesica, & dolor tempore generationis vesicæ, major, quam a foliis & floribus non contusis, tolerabilis tamen facile.

7. In sanando vulnere eadem est difficultas, quam faciunt ranunculi sceleratus, & bulbosus.

8. Succus expressus acerrimus est, præsertim præparatus ex sola herba, abjecta radice; gustatus siquidem vehementissime & illico linguam ac labia urit, sola retentione in ore, nulla agitatione motus in ore, oritur dolor urens, fere potentior illo, quem radix ranunculi bulbosi producit, aut summitates ranunculi scelerati. Adeo penetrans & fortis hic succus est, ut a parumper longiori ejus retentione in ore, lingua erodatur, & dolor pertinacissime inhæreat, imo cessante jam urente dolore, & ejecto quamvis illico post perceptum dolorem succo, dentes extra alveolos, imo & in ipsis alveolis doleant, & quodam afficiantur ingrato stupore.

9. Succus Melissæ vel & melisso-phylli licet quadrupla copia admistus succo hujus ranunculi, nil mitigavit acrimoniam, imo eam potius auxit. Acetosa sola commista æquali portione, & cum hoc ranunculo contusa,  
mi-

minuit acrimoniam, & majori admista copia eam delet, non tamen idem facit succus acetosæ.

10. Uncia una succi canis parvi faucibus intrusa, cui per tres horas omnis denegabatur aquæ potus, eum post tres dies occidit, prægressis prius clamoribus enormibus, vomitu, alvi solutione copiosa, convulsivis agitationibus. Examinatus œsophagus ac ventriculus totus inflammatus, præfertim vero in ventriculi interna superficie rubedo summa, in variis locis livedo & erosio, notabiles vesiculisque similes multæ elevatae papulæ pellucidæ videbantur.

11. Drachma media succi mista unciis tribus aquæ ita mitis fit, ut in ore retineri queat, sapore prius subdulci linguam afficiens: post 5. circiter minuta secunda primo stimulus linguam urens se prodit, ita tamen, ut toleretur a lingua, & sensim per affluxum salivæ deleatur. Unciæ vero octo aquæ totam acrimoniam delent, & a me haustæ tot unciæ fuerunt impune, & ægris da-



tæ nullam fecerunt sensibilem , etiam vel minimam molestiam , aut noxam; functionum animalium potius major agilitas observabatur.

12. Succi drach. media quatuor unciis aquæ mista post quatuor dies gustata dulcissimum habuit primo saporem , post unum autem circiter minutum primum excitavit levissimum vellicantem in lingua dolorem, ut & in palato.

13. In instituendis cum hoc ranunculo experimentis per gustum, cavendum, ne vel nimis diu retineantur in ore vel flores, vel succus post perceptum pruritum , ne vel nimis cito unum post alterum instituatur; vix enim ter de die degustandum succum hujus ranunculi suadeo , iis saltem , qui linguam habent mea non callosiorem , quamvis & mea non sit valde delicata.

14. Si germina decoquantur cum aqua , manipulus v. g. unus in libra una aquæ , citius acrimonia avolat, quam in experimento decoctionis ran-

nun-

nunculi scelerati & bulbosi, & germina fiunt insipidissima.

15. Experimenta *Nro.* 9. 12. 14. 15. 17. 18. 27. 29. 32. 33. 34. 36. 37. circa ranunculum sceleratum instituta quoque in echinato, reliqua vero *Nro.* 40. recensita non tentavi, utpote partim superflua ratus, partim metuens tot magnas a repetita degustatione toleratas molestias. Semina præterea matura sunt ita mitia, ut neque vel minima acrimonia, vel levissima stiptica detegi possit alpredo.



*Ranunculus sardous*. CRANTZ *Fasc. II.*  
*Stirp. Austr.* p. 84.

*Ranunculus apii folio lanuginosus*. C.  
B. *pin.* 180.

*Ranunculus 2dus* MATTHIOLI *fol.* 458.

**R**anunculi hujus folia crassa sunt, æque ac caulis pilosa, seu lanuginosa, corollæ petala ungue prædita, cui adnexa est glandula parva tumidula figuræ triangularis, interdum quadrangularis. Radix est fasciculus multarum albarum radicularum perpendicularium fere, filiformium, paucissimis lateralibus fibrillis præditarum. Variat multum hic ranunculus foliis; radicalia plerumque sunt triloba, interdum vero solum obscure triloba, quandoque pinnatifida, interdum & triloba & pinnatifida mista, pinnis jam profundius incisis, jam magis superficialibus.

Planta parva, quamdiu radicalia tantum folia exerit, refert perfecte apium officinarum, & triloba folia non-



nonnulla, oblitteratis lobis uno alterove, cernuntur, in adulta planta plus pinnatifida, imo quandoque ranunculum repentem multum referens planta invenitur, stolonibus reptantibus solummodo carens.

## EXPERIMENTA.

1. Radiculæ gustatæ nullam acrimoniam habent notabilem, levissimo tantum stimulo vellicante linguam titillantes, & hic non nisi percipitur post longam masticationem. Inest tamen sensibilis asperedo stiptica etsi non nociva, quod deglutitio me docuit; siccatae minime sternutatoriae sunt.

2. Eodem modo linguam afficiunt folia radicalia, praesertim herbæ jam adultioris, uti & caulis versus radicem. Caulina vero folia acria & urentia sunt, tamen utcunque acrimonia urens a lingua toleratur, imo & a ventriculo perfertur sine notabili molestia, si videlicet duo vel tria deglu-

tiantur folia, plura nunquam deglutivi.

3. Floris petala, stamina, calyx etiam mitia sunt. Flores demptis germinibus 10, 12, 20. & ultra deglutiti, prius in ore bene contriti, nullam fenfibilem in me fecerunt mutationem, fola excepta afpredine in lingua & ore relicta.

4. Si germina nondum matura & ficca guftentur, linguam illico acerrime urunt dolore diu perfeverante. Deglutita pauca quantitate, tria quatuorve, tantum moleftum producant dolorem fimilem illi, qui a foliis rannunculi fcclerati *Nro. 23.* oritur, balfamo peruviano & aquæ repetito egregio haufu ceffantem. Ubi femel ficca fuerint, penitus evadunt effœta.

5. Caulis fpongiofus, hirtus verfus fummitatem, guftatus non acrior, quam folia fuperiora, atque etiam verfus maturefcentiam feminum æque mitis, ut folia radicalia, & femina matura omni fapore, vel acrimonia deftituta funt.

6. Folium caulinum applicatum parti laterali digiti annularis usque ad perceptum pruritum, & deinde abjectum, nullam fecit vesicam, diutius tamen relictum eam produxit.

7. Germina tantum intra 12. horas eam excitarunt, satis aqua turgida.

Alia experimenta cum hoc ranunculo non tentavi, cum judicem sufficere praesentia ad probandam ejus acrimoniam nocivam, saltem germinum, & quomodo mitigari, domari queat, supra recensita tentamina docent.





**Ranunculus Napellifolius.** CRANTZ  
*Fasc. II. Stirp. Austr. p. 90.*  
*Nro. 10.*

**Ranunculus acris.** LINN. *Syst. Nat.*  
*T. II. p. 1087. Nro. 28.*

**Ranunculus pratensis erectus acris.**  
 C. B.

*Descriptio Cl. Prof. CRANTZ bona est,*  
*& ex illa sola optime dignoscitur.*

## EXPERIMENTA.

1. Est æque acris ut bulbosus, succulentior tamen, volatilior ejus spiritus, acris, & vehementia acrimoniæ in omnibus partibus fere æqualis, germinibus florum exceptis, quæ urentius feriunt linguam, pertinaciorrem dolorem excitant, & citius se manifestantem.

Cultus tamen in horto, vel sponte in terra culta crescens in horto Dni. de HARACK in Pentzing a me mitissimus deprehensus est, mitior auricomo. Folia plurima impune  
 ma-

maſticavi, deglutivi. Inveni præterea mitiorem hunc ranunculum in Gatterholtzel, quam in monte retro villam S. Viti.

2. Veſicam germina æque cito faciunt, ut bulbus ranunculi bulbofi: reliqua experimenta fere eadem, ut in prioribus, exceptis 25, 26, & 40, quæ non cum hoc ranunculo inſtitui, videntur tamen eſſe eadem.



Ranunculus Breyninus. CRANTZ ibidem. p. 91. Nro. 11.

*Descriptio ibi habetur optima, & ejus copia examinandi ex hortulo hujus Cl. Viri facta est.*

I. Collectus ibidem in hortulo tempore florentiæ fere acrior a me deprehensus est, quam sceleratus & bulbosus, interim tamen in meo hortulo Tergesti cultus mitior fuit prioribus, præsertim radix, caulis, folia; flores tamen sat acres erant. Videtur probabile, eum in locis natalibus adhuc acriorem esse; experimenta tentari merentur ab iis, qui eum in locis natalibus colligere satagunt, & ideo præter applicationem externam ad excitandam vesicam, quam æque, licet tardius, ut priores flores produxerunt, alia in prioribus numerata experimenta tentare neglexi.



*Ranunculus Illyricus.* CRANTZ *ibid.* m  
p. 87.

*Ranunculus lanuginosus angustifolius*  
*grumosa radice major, minor.*  
C. B. *pin.*

1. Hic *Ranunculus* in omnibus  
partibus æque acris, ut *bulbosus*,  
omnia experimenta, quæ cum bul-  
boso institui, in hoc familia deprehen-  
di, radix tamen *bulbosa minoris acri-*  
*moniæ* est, & *vesicas* tardius,  
quam *bulbus bulbosi*  
*excitavit.*



*Ranunculus Pthora.* CRANTZ *ibidem.*  
p. 98. Nro. 17.

*Pthora* LINN. *Syst. Nat.* T. II. p. 1086.  
Nro. 10.

*Pthora Valdensium.* LOB. *adv. icon.*

I. In loco natali crescens acerrima planta est, superans scelerati ranunculi acrimoniam, ut me docuit collecta in Murlachiaë alpibus, ubi tamen experimenta necessaria facere non poteram. In horto vero *Clariss. Prof. CRANTZ* examinata, & cum ea plurima experimenta, quæ cum ranunculo scelerato tentavi, instituta fere erant eadem, & quidem in omnibus suis partibus æqualis acrimonia deprehensa fuit, etsi jam tempore florescentiæ examini subjecta fuisset. Post fructificationem vero maturam folia residua in herba, jamque minus succulenta, sat evadunt mitia, & multa omni acredine orba. Potui enim quatuor talia folia deglutire, absque superveniente vel minima molestia. Dum vero herba sicca est, tota penitus effœta evadit, & omnis qualitatis noxiæ expers. Ra-

*Ranunculus aquatilis.* CRANTZ *ibidem*  
p. 96. Nro. 14.

*Ranunculus aquatilis.* LINN. *Syst.*  
*Natur.* T. II. p. 183. Nro. 37.

1. *Ranunculus* hic notissimus est in stagnantibus aquis, imo & rivulis currentibus obvius ubique fere. Variat, ut inveni, notabiliter acrimonia, ratione loci, ubi crescit. Flumine & Tergesti in nonnullis aquis stagnantibus ita deprehendi acrem, præsertim vero flores, ut vesicam cuti applicatus produceret, licet tardius scelerato & bulboso ranunculo. Quem vero collegi Viennæ versus Baumgarten adhuc acrior fuerat, dum ex adverso circa Schönbrun crescens vix linguam stimulat. In genere tamen flores semper acriores herba, & post fructificationem etiam herba multo mitior, quam ante florescentiam. Alia experimenta cum hoc  
ra-



ranunculo insituere superfluum esse duxi, utpote jam alioquin ex prioribus facile determinanda. Addere tamen debeo flores recentes, contusos, naribus ad perceptum usque pruritum suppositos potenter sternutationem ciere, siccos vero hoc non efficere.



*Ranunculus ficaria*. CRANTZ *Fasc.* II.

*Stirp. Austr.* p. 99. Nro. 12.

*Chelidonia rotundifolia* major minor-  
ve. B. *pin.* 167.

*Ficaria*. *Nova Plant. gener.* DILL.  
T. V. *icon.*

**N**otissima omnibus herba, & inter  
antifcorbutica laudata, admisceri  
solet verno tempore aliis plantis, &  
in acetariis comedi.

1. Folia & flores mitissimi, vix  
vel levissimum continentia stimulum.  
Radix tamen, quæ granulata est,  
acris est ita, ut fortiter linguam vel-  
licet, & simul ingrato, stiptico, pri-  
mo acido, dein amarescente, nauseo-  
so sapore prædita. Recens tusa, &  
applicata cuti quoque vesicans est,  
diutius tamen super cutem relinqui  
debet, quam ranunculi bulbosi radix,  
neque ulcus ita pertinaciter sanitati  
resistit. Cocta amittit omnem acri-  
moniam, uti & exsiccata; acrior præ-  
terea ante florescentiam deprehendi-  
G tur,

tur, & tunc fere solum lenis vesicatorii vices gerere potest; agunt tamen citius, certius, & melius hac radice bulbi ranunculi bulbosi. Interim succus radicis sternutatorium tutius est, quam omnium priorum.

Examinavi quidem etiam ranunculum auricomum (a) & repentem (b) lanuginosumque (c), verum eos ita inveni mites, & ab acrimonia ranunculorum quoad saporem differentes, ut potius inter oleracea, nutritioni idonea, quam inter venenorum classem collocari mereantur.

(a) CRANTZ *Fasc. II. Stirp. Aust.* p. 85. Nro. 3.

(b) IDEM *ibidem* p. 89. Nro. 9.

(c) *ibidem* p. 96. Nro. 15.





# COROLLARIA.

1. **E**x omnibus jam institutis, & recensitis experimentis constat: Ranunculos *sceleratum*, *bulbosum*, *echinatum*, *sardoum*, *napellifolium*, *illyricum* *ptthoram* herbas esse venenatas valde, acrimonia caustica, erodente inflammante, exulcerante præditas. *Vide Nro. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 16, 20, 21*, in experimentis ranunculi *scelerati*.

2. Ufu ergo interno periculosissimos, hominibus saltem & canibus, dolores summos, convulsiones, ventriculi inflammationem fortissimam erosionem &c. producentes, ipsam tandem mortem, *Vide Nro. 23, 24, 26*, experiment. ranunculi *scelerati*.

3. Externo usu vero esse vesicatorium egregium, diu attrahens, ulcus pertinax faciens, sternutatoriumque forte, & excorians, si diutius quam oportet, in naribus relinquantur. *Vide Nros. 8, 9, 10, 13*, exper-

rimentorum ranunculi scelerati, nil tamen horum facere has herbas exsiccatas 18, 19, 22, 32, 34. *ibid.* & 14, 15. echinati, & 20. bulbosi.

4. Pertinacitatem ulceris quoque majorem esse, quo diutius applicati ranunculi hærent parti, & si vesica aqua turgida aperiatur, *vide Nros 9, 10, 11. ibidem.*

5. Acrimoniam venenatam ranunculorum consistere in parte volatili, eamque igne, decoctione, exsiccatione, maturatione auferendam, & ea ablata reddi mites, ipsi etiam nutritioni aptos, *vide Nros 14, 15, 17, 18, 19, 22, 32, 34, experiment. ibidem, & Nrum 20. experiment. ranunculi bulbosi, item 14, 15. echinati.*

6. Hanc partem volatilem, quam spiritum rectorem, inodorum tamen, vocare licet, neque esse acidam, neque alcalinam, *vide Nros 30, 31, 32. experim. Ranunculi scelerati, & distillata hac parte decoctum ranunculorum fieri egregium pectorale, gratum*

tum remedium, & ut me docuit repetita observatio, utilius decocto liquiritiæ, vide exper. 20. ranunculi scelerati.

7. Aceto, melle, saccharo, vino, & fere omnibus quæ linguæ saporem qualemcunque imprimunt, acrimoniam augeri & summe causticam reddi, item spiritu vini, acidis mineralibus, oleo tartari per deliquium, vide *Nros* 27, 29, neque castoreum, neque 700. herbas hanc acrimoniam domare posse; vide ibidem *Nrum* 40, unde intelligitur, cur in acetariis aliis admixtus herbis, comestus venenatior sit, & peiores effectus producere debeat ranunculus, quam si coctus cum aliis comedatur.

8. Ergo neque succus melissæ, melissophylli ex aceto haustus, neque vinum forte dulce larga quamvis copia, neque castoreum vino dulci mistum antidotum, sed potius vim venenatam augentia, quamvis contrarium velint veteres, vide ibidem *Nro.* 40. Cavendum ergo ab aceto,



& a vino, ubi suspicio est ranunculum unum vel alterum comestum fuisse.

9. Ex 700. igitur herbis sola acetosa est, quæ mitigat acrimoniam, & inertem reddit, si vel cum illis masticatur, aut contunditur, *vide Nros 35, 36, 38.* experim. ranunculi scelerati, non tamen eundem præstat effectum, si succus acetosæ misceatur ranunculorum succo; *vide ibidem Nrum 39.*

10. Neque acetosa minuit dolorem a ranunculis excitatum, si semel partes erosæ ab acrimonia ranunculorum fuerint, tunc enim eum, ut alia acida, potius auget, *vide ibidem Nrum 35.*

11. Mitigant & dolorem a ranunculis in lingua excitatum, debilius tamen acetosa, baccæ ribesiorum immaturæ, etsi acidæ sint, uti acetosa 37. Et hoc tamdiu constanti experimento manifestum fit, quamdiu linguae superficies adhuc sana, quemadmodum corollario priore adnotavi,

12. Aqua tamen ex omnibus notis est antidotum optimum mitigans, iners reddens ranunculorum venenum acre, vide *Nrum* 28. ibidem, & illud usibus internis aptum reddens, ut diuresim promoveat, mucosos humores incidat. Dysuriam senilem sanare, ulcera pulmonum depurare, venerem effœtam restituisse, in decrepito 80. annorum senes observavi.

13. Consistit ergo virtus medicata ranunculorum in acri penetrante parte, quæ per artem salutaris, omnes partes corporis permeans absque effectu notabili incrementis caloris, animalium tamen functionum incremento suas exerit vires, vide *Nrum* 18. ranunculi bulbosi. A prudentis igitur & sagacis Medici sedula observatione & in desperatis morbis applicatione horum ranunculorum, multa expectari poterunt, in morbis nonnullis generi humano forte utilissima.

14. Duplex effectus a deglutitis ranunculis est, & diverso remedio, per hæc experimenta detecto, curatur. *Primus* est irritatio dolorifica integris adhuc partibus, quam acetosa & aqua curant optime, ibidem 35, 36. *Secundus* est nata erosio, quæ balsamo cedit peruviano ibidem 24, & aquæ tepidæ foli ibidem 25, vel cui blandissima demulcentia, ut althææ radix, mucilago seminum cydoniorum &c. gummi arabicum, terebinthina admista sunt, quorum tria ultima, in lingua erosa etiam pulchrum levamen mihi attulerunt.

15. Egregium habent usum externum ranunculi, præcipue bulbosus in illis morbis, ubi revulsione, aut derivatione diu perseverante opus est: partim quod hoc faciunt absque magno dolore, omni ergo ætati quam maxime idonei, partim, quod cito effectum præstent, & diu permanentem, partim denique quod nec in sanguine circulationis, nec caloris augmentum producant.

16. Et



16. Et ad hæc ranunculus bulbosus vel ideo maxime appropriatus, quia imo. ad serum autumnum usque in pratis haberi potest recens, semper acris, & jam primo vere iterum virens, facileque ab omnibus Pharmacopœis coli potest, perstantibus acrimoniæ viribus per culturam non adeo mutabilibus. 2do. vero bulbi facile virides sub sabulo per hyemales menses asservari acres queunt.

17. Posset ergo facile ex usu medico cantharidum usus in vesicatoriis proscribi; multum alioquin incommodum, dolorificum, tardum vesicatorium, neque omnibus morbis, ubi derivatione revulsione opus, accommodum.

18. Non tamen tollunt ranunculi verrucas, nisi valde superficiales sint *Nro. 13*, neque tute pernio-nes decocto foveantur, cum vesicas excitet; neque radix sicca sternutatorium est, neque naribus admoda dentium dolores levat, ut vult

**DIOSCORIDES** (a) & **GALENUS** (b). Saltem ranunculi littorales austriaci & Viennenses id non præstant.

19. Posse tamen psoras, & lepras curare interne sumptos, & eorum decoctum acre tepide instar balnei externe cum prudentia adhiberi, ut **GALENUS** perhibet, probabile est, & meretur fœda horum morborum facies Medicorum attentionem.

20. Ranunculus bulbosus scelerato potentior, ergo & venenatior. Sardous scelerato acrimonia videtur similis; sed neque in hoc, neque scelerato, ea acrimonia radicibus inest, quæ sterutationem produceret, dum exsiccatæ sunt. Echinatus succum penetrantiorē largitur bulboſo, vide *Nrum.* 8. experim. ranunculi echinati. Omnium

(a) *Libr. II. Commentar. Math. p. 610.*

(b) *Libr. VI. simpl. Medic.*

nium acerrimus est Breyninus vide  
 observ. de hoc ranunculo *Nro. 1.* Il-  
 lyricus & Napellifolius bulbofo si-  
 miles; Pthora quoque acrimonia sce-  
 leratum superat, vide de illis ex-  
 perimenta. Ergo potius scelerati di-  
 cendi sunt ranunculus bulbosus, Illy-  
 ricus, Breyninus, Napellifolius,  
 Pthora, & Echinatus demum  
 quoad succum.

F I N I S.























